

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
JOURNAVX (jor na vix)
(suzetrigine)
comprimidos, para uso oral

¿Qué es JOURNAVX?

JOURNAVX es un medicamento recetado que se utiliza para el tratamiento de adultos con dolor moderado a intenso a corto plazo (agudo).

Se desconoce si JOURNAVX es seguro y eficaz en niños.

No tome JOURNAVX si está tomando ciertos medicamentos que son inhibidores potentes de una enzima llamada CYP3A.

Consulte a su proveedor de atención médica si no está seguro.

Antes de tomar JOURNAVX, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- Si tiene problemas hepáticos. Las personas con problemas hepáticos pueden tener un mayor riesgo de sufrir efectos secundarios por tomar JOURNAVX.
- Si está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si JOURNAVX podría causar daño al bebé en gestación. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si tomará JOURNAVX durante el embarazo.
- Si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si JOURNAVX pasa a la leche materna. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si tomará JOURNAVX mientras amamanta.

Infórmele al proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Tomar JOURNAVX con otros medicamentos determinados puede afectar el modo en que funcionan JOURNAVX y los demás medicamentos, y puede aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios. Consulte **“No tome JOURNAVX”**. Pídale a su proveedor de atención médica o farmacéutico una lista de estos medicamentos si no está seguro.

En especial, debe informarle al proveedor de atención médica si toma:

- anticonceptivos hormonales (anticonceptivos) que contienen progestinas **distintas de** levonorgestrel o noretindrona. Si toma uno de estos anticonceptivos (progestinas distintas de levonorgestrel o noretindrona), es posible que no funcionen tan bien durante el tratamiento con JOURNAVX. También debe usar anticonceptivos no hormonales, como preservativos, u otros métodos anticonceptivos hormonales durante el tratamiento con JOURNAVX y por 28 días después de dejar de tomarlo.
- medicamentos que son sustratos de la enzima CYP3A, ya que pueden volverse menos eficaces durante el tratamiento con JOURNAVX. Es posible que su proveedor de atención médica deba ajustar la dosis de su medicamento cuando comience a tomar JOURNAVX o deje de hacerlo.

Conozca los medicamentos que toma. Lleve una lista de sus medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando obtenga un medicamento nuevo.

¿Cómo debo tomar JOURNAVX?

- Tome JOURNAVX por vía oral exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.
- Los comprimidos de JOURNAVX deben tragarse enteros. **No** mastique ni triture los comprimidos.
- Para la primera dosis de JOURNAVX:
 - Tome 2 comprimidos de JOURNAVX con el estómago vacío.
 - Tome la **primera dosis de JOURNAVX** al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer. Durante este tiempo, puede beber líquidos claros, como agua, jugo de manzana, caldo de verduras, té o café negro.
- **Después de la primera dosis** de JOURNAVX:
 - Tome 1 comprimido de JOURNAVX 12 horas después, con o sin alimentos.
 - Continúe tomando 1 comprimido de JOURNAVX cada 12 horas, según las indicaciones de su proveedor de atención médica.
- Tome JOURNAVX por el menor tiempo necesario.
- **Si tiene problemas hepáticos o toma otros medicamentos**, su calendario de administración de la dosis puede ser diferente.
- Si **olvida tomar una dosis** de JOURNAVX y **no tiene** problemas hepáticos ni toma otros medicamentos:
 - **Tome la dosis perdida** tan pronto como sea posible, luego tome la siguiente dosis programada a la hora recomendada.
 - Si **olvida 2 o más dosis** de JOURNAVX, **tome 2 comprimidos de JOURNAVX** y, a continuación, tome la

siguiente dosis programada a la hora recomendada.

- Si **olvida una dosis** de JOURNAVX y **tiene problemas hepáticos o está tomando inhibidores moderados de una enzima llamada CYP3A:**
 - **Tome la dosis perdida** lo antes posible.
 - Si tomó la dosis perdida y su próxima dosis programada es dentro de las 6 horas, omita esa dosis y tome la siguiente dosis programada a la hora recomendada.
- Si no está seguro sobre la dosificación, pregúntele a su proveedor de atención médica o farmacéutico.
- Si toma JOURNAVX en exceso, llame a su proveedor de atención médica o a la línea de ayuda para casos de intoxicación al 1-800-222-1222 o diríjase inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano.

¿Qué debo evitar mientras tomo JOURNAVX?

- No consuma alimentos ni bebidas que contengan toronja (pomelo) durante el tratamiento con JOURNAVX.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de JOURNAVX?

Los efectos secundarios más frecuentes de JOURNAVX incluyen:

- picazón
- espasmos musculares
- aumento del nivel sanguíneo de creatina fosfoquinasa
- erupción

JOURNAVX puede reducir temporalmente la probabilidad de que las mujeres queden embarazadas durante el tratamiento. Hable con su proveedor de atención médica si le preocupa quedar embarazada. Si está usando anticonceptivos, debe continuar usándolos durante el tratamiento con JOURNAVX.

Infórmele a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JOURNAVX.

Llame al médico para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al teléfono 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo almacenar JOURNAVX?

Almacene JOURNAVX a temperatura ambiente de entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).

Mantenga JOURNAVX y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de JOURNAVX.

A veces, los medicamentos se recetan con fines distintos a los mencionados en el folleto de Información para el Paciente. No use JOURNAVX para una condición médica para la que no fue recetado. No administre JOURNAVX a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño. Puede pedirle a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre JOURNAVX, escrita para los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de JOURNAVX?

Ingrediente activo: suzetrigine

Excipientes: croscarmelosa sódica, succinato acetato de hipromelosa, estearato de magnesio y celulosa microcristalina. El recubrimiento del comprimido contiene laca de aluminio azul FD&C n.º 2, polietilenglicol, alcohol de polivinilo parcialmente hidrolizado, talco y dióxido de titanio.

Fabricado para: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210



JOURNAVX, VERTEX y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Vertex Pharmaceuticals Incorporated.

©2025 Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Para obtener más información, visite www.JOURNAVX.com o llame al 1-877-634-8789.